

L'âge moyen au décès associé à la COVID19 est de 80 ans. L'âge moyen des myocardites (inflammation du muscle du cœur) associées au « vaccin » Pfizer est de 39 ans au 16/6/2021 (*)

Points d'attention de la pharmacovigilance concernant Pfizer/Cominarty

L'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament (ANSM) incite à faire une surveillance médicale urgente après vaccination dans des cas fréquents, pouvant occasionner des myocardites, péricardites, hypertensions artérielles

Extraits marquants du dernier rapport de pharmacovigilance de 18 pages du 27/08/2021 sur

<https://ansm.sante.fr/uploads/2021/08/27/20210824-vaccins-covid-19-fiche-de-synhte-se-vf.pdf> :



Signaux potentiels ou événements déjà sous surveillance :

- Zona
- Troubles du rythme cardiaque
- Thrombopénie / thrombopénie immunologique / hématomes spontanés
- Déséquilibre diabétique dans des contextes de réactogénicité
- Echecs vaccinaux
- Pancréatite aiguë
- Syndromes de Guillain-Barré
- Syndrome d'activation des macrophages
- Réactivation à virus Epstein-Barr
- Méningoencéphalite zostérienne
- Aplasie médullaire idiopathique
- Hémophilie acquise
- Polyarthrite rhumatoïde
- Néphropathies glomérulaires
- Troubles menstruels

Signaux confirmés :

- Hypertension artérielle

Devant tout symptôme évocateur d'une hypertension artérielle (malaise, céphalées, vertiges,...), un contrôle de la pression artérielle devra être envisagé pour une prise en charge médicale la plus précoce possible, si elle s'avère nécessaire.

- Myocardite/Péricardite

L'ANSM recommande à toute personne présentant des symptômes tels qu'un essoufflement (dyspnée), des douleurs dans la poitrine, des palpitations (battements cardiaques forts,) ou un rythme cardiaque irrégulier de consulter rapidement un médecin.

Suivi spécifique des effets indésirables rapportés chez les femmes enceintes et allaitantes - Événements déjà sous surveillance :

- Événements thromboemboliques
- Contractions utérines douloureuses
- Morts in utero

Dans quel cas Pfizer/Comirnaty est-il déconseillé ?

La Base Claude Bernard (acteur indépendant des pouvoirs publics) déconseille le « vaccin » Pfizer aux femmes enceintes ou allaitantes, aux moins de 16 ans, en cas de fièvre, aux immunodéprimés, en cas de trouble de la coagulation, hémophilie ou thrombose, en cas de réaction allergique (copie écran extraite au 27/8/2021)

80 ml

BCB
Base Claude Bernard

Contre-indiqué dans les cas suivants :

- Voie intraveineuse
- Voie SC
- Voie intradermique

Déconseillé dans les cas suivants :

- Grossesse

Indications limitées à l'adulte de plus de 16 ans

- Réaction anaphylactique
- Réaction d'anxiété
- Maladie fébrile ou infection aiguë
- Thrombopénie
- Trouble de la coagulation
- Hémophile
- Immunodéprimé
- Traitement immunosuppresseur
- Allaitement

BCB
Base Claude Bernard

Solutions - Société - Partenaires - Espace client - Assistance - Contact

Rechercher un produit

Base Claude Bernard,
La Base de données sur les Médicaments
et les produits de santé

EN SAVOIR PLUS

ESSAI GRATUIT

Quelle est la fréquence des effets indésirables requérant une surveillance médicale selon l'ANSM ?

Les symptômes indiqués page précédente concernant la surveillance médicale apparaissent parmi les plus fréquents : Céphalée (2^{ème} effet indésirable le plus fréquemment rapporté), hypertension artérielle (10^{ème}), Malaise (12^{ème}), Tachycardie (palpitations cardiaques 14^{ème}), Vertige (15^{ème})

N'hésitez pas à consulter un médecin également en cas d'autres effets indésirables et signalez tout effet indésirable sur <http://signalement-sante.gouv.fr>

Source : (*)

export de la Base Nationale de Pharmacovigilance au 16 juin 2021 obtenue de l'ANSM via une requête d'accès aux documents administratifs (4 598 pages) voir <http://viruswar.fr/pharmacovigilance.php>

ouest-france.fr/sante/vaccin/royaume-uni-pas-d...
Recherche
Accueil / Santé / Vaccin
AUTODESK LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE DESSIN 2D AUTOCAD LT PUISSANT ACHETER
Royaume-Uni. Pas de vaccin anti-Covid pour les 12-15 ans en bonne santé
Les enfants en bonne santé âgés de 12 à 15 ans n'ont pas besoin d'être vaccinés, a annoncé le comité en charge de la vaccination au Royaume-Uni.
Ouest-France avec AFP.
Publié le 03/09/2021 à 18h01
Pas assez de bénéfice par rapport au risque pris

Code pénal

Empoisonnement (221-5)

Extorsion (ou tentative) d'engagement sous contrainte morale (312-1)

Plus d'informations

Déjà plus de 23 500 abonnés sur Twitter

@VirusWar <http://viruswar.fr>

(vaccin, requête contre « passe sanitaire » dans hypermarchés, etc...)

Ne pas jeter sur la voie publique

Nombre de cas d'effets indésirables rapportés par la pharmacovigilance des vaccins en Europe :

Les vaccins contre la Covid-19 rassemblent bien plus d'effets indésirables en 6 mois, qu'il n'y en a eu pour tous les autres vaccins réunis en 40 ans mais ces effets indésirables des vaccins Covid-19 restent très sous notifiés.

Eudravigilance C-19 au 04/09/2021					
Critère gravité	Astrazeneca	Pfizer	Moderna	Janssen	Total
Mort	3 180	7 017	3 470	503	14 161
Mise en jeu du pronostic vital	6 963	8 024	3 848	949	19 761
handicap/ incapacité	19 831	13 404	4 001	749	37 950
anomalie congénitale, naissance défectueuse	112	137	81	5	334
A causé hospitalisation prolongé	18 234	30 174	12 575	2 273	63 158
Médicalement significatifs	140 472	101 644	27 465	4 187	273 601
Cas graves	188 792	160 400	51 440	8 666	408 965
Cas non graves	178 332	241 106	55 620	17 184	492 015

Source base de données européenne officielle Eudravigilance C-19 au 04/09/2021 mis en forme par <https://www.data-like.com/>

Consentement éclairé du patient requis surtout pour un produit expérimental

La loi impose que vous délivriez un consentement libre et éclairé (article L111-4 du Code de la Santé Publique)

Exemple de document requis au CHU de Quimper :

Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité bénéficier d'une vaccination anti-Covid par le produit Pfizer. Veuillez prendre connaissance des informations disponibles à ce jour sur ce produit.

- Le vaccin Pfizer a bénéficié d'une AMM* conditionnelle et est déployé dans sa phase 3 d'essai clinique (efficacité thérapeutique) sur des patients volontaires (50 000)
- L'objet de la vaccination est essentiellement de prévenir des formes graves, en particulier chez les patients âgés et/ou vulnérables. L'étude clinique a montré une diminution de 95% des cas symptomatiques
- La vaccination par ce produit n'empêche pas à 100% le portage sain du virus ni sa transmission par les patients vaccinés. Pour ces raisons, les gestes barrières et la distanciation sociale risquent de perdurer malgré la vaccination et selon les recommandations gouvernementales.
- La durée de l'immunité acquise par la séquence vaccinale est inconnue. Il est donc possible que vous soyez invité dans le futur à réaliser d'autres rappels vaccinaux.
- A ce stade la vaccination ne protège pas contre tous les variants du Coronavirus. Toutefois sa protection est forte (>90%) sur les variants circulants actuellement en métropole.
- Selon l'OMS* et le dossier d'AMM* de l'industriel il est recommandé de ne pas mélanger les différentes technologies vaccinales chez la même personne.
- Il n'y a aucune étude sur l'innocuité de la vaccination chez la femme enceinte et allaitante. Toutefois, la vaccination peut être préconisée chez la femme enceinte, en particulier avec facteurs de risques (obésité, diabète, hypertension)
- Les effets secondaires à court terme sont essentiellement : une sensibilité au point d'injection (fréquent), de la fièvre et des frissons, des maux de tête, une fatigue (possible), une hypersensibilité au vaccin (exceptionnel). Ces symptômes dépassent rarement les 48 heures et sont bien contrôlés par la prise de paracétamol répartie sur cette période.
- Les effets secondaires à moyen et long terme ne sont pas connus à ce stade. Ainsi l'indication de la vaccination par le prescripteur tient compte du rapport bénéfices/risques selon chaque patient, et peut être modifiée dans l'avenir.

Dans tous les cas nous vous invitons, en cas d'effets secondaires,

- Soit d'informer votre médecin traitant, votre pharmacien ou tout autre prescripteur
- Soit de renseigner le site de la pharmacovigilance : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Je, soussigné, certifie avoir pris connaissance de ces informations claires et loyales, et certifie consentir à être vacciné

Signature :